Klubs: Latvijas Šveices kalnu suņu klubs

Datums: 29.03.2018.

PRASĪBAS VAISLAS DZĪVNIEKIEM

Nr.	ŠĶIRNE	Izst. vērtēj. k/s	Pārošanas vecums no - līdz		HD		ED		Patella		Acu pārbaude	Ģenētiskais tests, citas pārbaudes	Uzvedības, darba spēju pārbaudes
			Kuce	Suns	Kuce *	Suns	Kuce *	Suns	Kuce	Suns			
1.	**Bernes ganu suns**	jāsaņem divi eksterjera novērtējumi ne zemāki par „teicami", no kuriem viens var būt saņemts junioru klasē, un vismaz vienam novērtējumam jābūt saņemtam Kluba specializētajā vai starptautiskajā izstādē	20 mēn. - 8 g.v.	20 mēn. – bez max vec.ierob.	A; B; C	A; B; C	0; 1	0; 1	-	-	-	-	-
2.	**Lielais Šveices ganu suns**	jāsaņem divi eksterjera novērtējumi ne zemāki par „teicami", no kuriem viens var būt saņemts junioru klasē, un vismaz vienam novērtējumam jābūt saņemtam Kluba specializētajā vai starptautiskajā izstādē	20 mēn. - 8 g.v.	20 mēn. – bez max vec.ierob.	A; B; C	A; B; C	0; 1	0; 1	-	-	-	-	-
3.	**Entlebuhas ganu suns**	jāsaņem divi eksterjera novērtējumi ne zemāki par „teicami", no kuriem viens var būt	18 mēn. - 8 g.v.	15 mēn. – bez max vec.ierob.	A; B; C	A; B; C	0; 1	0; 1	-	-	progresējošā tīklenes atrofija (PRA), katarakta,	-	-

		saņemts junioru klasē, un vismaz vienam novērtējumam jābūt saņemtam Kluba specializētajā vai starptautiskajā izstādē									glaukoma. Dzīvnieki, kuriem konstatēta kāda no minētajām saslimšanām, nav izmantojami vaislā		
4.	**Apencellas ganu suns**	jāsaņem divi eksterjera novērtējumi ne zemāki par „teicami", no kuriem viens var būt saņemts junioru klasē, un vismaz vienam novērtējumam jābūt saņemtam Kluba specializētajā vai starptautiskajā izstādē	18 mēn. - 8 g.v.	15 mēn. – bez max vec.ierob.	A; B; C	A; B; C	0; 1	0; 1	0; 1	0; 1	progresējošā tīklenes atrofija (PRA), katarakta, glaukoma. Dzīvnieki, kuriem konstatēta kāda no minētajām saslimšanām, nav izmantojami vaislā	-	-

Piezīmes:

*Kuces, ar gūžas locītavas displāzijas pakāpi D (vienai vai abām locītavām) vai elkoņa locītavas rezultātu 2 (abām elkoņa locītavām), izmantošana vaislā pieļaujama izņēmuma gadījumā - tikai vienu reizi. Minētajā gadījumā jāpiemeklē partneris ar rentgenoloģiskās izmeklēšanas rezultātiem gūžas locītavai – A; B; elkoņiem – 0.